

康寧醫護暨管理專科學校九十二學年度二年制夜間部
在職專班入學考試
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數 1/4

單選題：(每題 2 分，答錯不倒扣，滿分 100 分)

1. 為嚴重急性呼吸症候群 (SARS) 病患抽痰後，抽痰管應丟棄於 (A) 黑色塑膠袋 + 腐蝕性廢棄物標誌 (B) 紅色塑膠袋 + 感染性廢棄物標誌 (C) 黃色塑膠袋 + 感染性廢棄物標誌 (D) 紅色塑膠袋 + 毒性廢棄物標誌。
2. 在醫療環境中光線的調節上，應將老年病患房間光線如何處理，最為適合？(A) 為使眼睛休息，室內光線宜稍暗 (B) 建議使用 200-300 米燭光之光線最適合老年人的水晶體調節 (C) 老年人房間光線宜明亮即可 (D) 老年人的房間光線，宜直接照射老年人的眼睛。
3. 中華民國政府於此次 SARS 疫情防治中，**新聞** 廣公公共電視媒體做 SARS 疫情政策宣導，此種溝通方式屬於 (A) 單向溝通 (B) 雙向溝通 (C) 字型溝通 (D) 圓週型溝通。
4. 醫師開立醫囑如下：「panadol 1# p.o. q.4.h. i.r.n.」，請問此醫囑屬於 (A) 長期醫囑 (B) 臨時醫囑 (C) S.O.S. 醫囑 (D) 長期醫囑 + S.O.S. 醫囑。
5. 中華民國政府於此次 SARS 疫情防治中，所採行的居家隔離法，是源自於疾病傳染防治的何種概念？(A) 消毒法 (B) 滅菌法 (C) **試** 外科無菌法 (D) 內科無菌法。
6. 中華民國政府於此次 SARS 疫情防治中，**卷** 在醫院急診室採行「全面性防護」(universal precaution)，請選出下列最接近上述名詞意思的描述？(A) 將所有發燒超過 38°C 病患，均視為可能傳染帶原者 (B) 針對預期或沾到發燒病患的所有血液、體液、分泌物均採取防護和隔離措施 (C) 是指病源體可藉由空氣、飛沫、手觸摸排泄物所接觸到病毒的途徑 (D) 多洗手、戴口罩。
7. 請問 3% ~5% 漂白水，其殺滅微生物的機轉為何？(A) 破壞細胞壁 (B) 破壞細胞膜的滲透性 (C) 使微生物產生脫水作用 (D) 使微生物核酸及蛋白質產生氧化作用。
8. 測量血壓時，會出現血壓值假性偏高的情況為：(A) 受測者的手臂低於心臟時 (B) 放氣太快時 (C) 測量者的視線高於刻度時 (D) 壓脈帶過寬時。
9. 為中風病人更換乾淨衣物時，協助穿脫衣物的原則，何者正確 (A) 由患側肢體先脫 (B) 由健側肢體先穿 (C) 由患側肢體先穿 (D) **卷** 與平常穿脫方法同，無特殊限制。
10. 病人下肢皮膚乾燥、脫屑且搔癢，最合適的護理措施是 (A) 加強沐浴及清潔 (B) 重新更換清潔作用更強的肥皂 (C) 於清潔或沐浴後塗抹合適之乳液 (D) 限制水份攝取。
11. 對於經徒手肌肉測驗，屬於肌肉力量不佳 (Poor) 的肢體，最適宜執行何種全關節運動？ (A) 被動運動 (B) 主動運動 (C) 加阻力運動 (D) 協助性主動運動。
12. 鼓勵病人做全關節加阻力運動的主要目的為： (A) 做更激烈運動前的暖身運動 (B) 增加肌肉強度，為一種耐受力的加強訓練 (C) 刺激伸屈反射 (D) 維持關節的柔韌性，預防關節僵硬。
13. 下列有關睡眠週期特徵之敘述，何者正確？ (A) REM 的特徵為呼吸、心跳均緩慢且規律 (B) Non-REM 的第四期極易被喚醒 (C) REM 會受鎮靜劑抑制 (D) Non-ROM 的第一期為熟睡期。

康寧醫護暨管理專科學校九十二學年度二年制夜間部
在職專班入學考試
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數 2/4

14. 下列何者是睡眠障礙 (Sleep disturbances) 所表現出的早期症狀？
(A) 主訴疲倦 (B) 情緒抑鬱 (C) 協調功能變差 (D) 幻聽。
15. 影響血壓高低的因素很多，下列敘述何者正確？ (A) 周邊血管的阻力愈高，血壓愈低
(B) 心臟收縮力愈差，血壓愈低 (C) 全身血液循環總量愈少，血壓愈高
(D) 血管壁的彈性愈差，血壓愈低。
16. 足踝扭傷 24 小時內最適宜的處理是：(A) 服用止痛藥 (B) 冰敷並以彈繃包紮固定
(C) 熱敷並固定 (D) 抬高患肢。
17. 有關溫水拭浴的敘述，下列何者錯誤 (A) 一般用於 39°C 以上的病人 (B) 拭浴以拍拭方式進行
(C) 拭浴過程中，若病人感覺冷可於頭部置熱水袋 (D) 拭浴後半小時，再測量病人的體溫。
18. 測量成人鼻胃管應插入長度的方法為：(A) 鼻尖到劍突之長度測量法 (B) 眉間到劍突之長度
測量法 (C) 鼻尖經耳垂到劍突之長度測量法 (D) 眉間到劍突與肚臍中點之長度測量法。
19. 執行靜脈輸液療法時，下列何項敘述正確？(A) 當病人需要血液檢體時，可直接由靜脈輸液
處採血 (B) 至少每 12 小時更換一次敷料與輸液套，以減少感染機會 (C) 在靜脈注入藥物
前，先檢查回血以確定輸液是否通暢 (D) 執行靜脈治療，需採行嚴格的內科無菌原則。
20. 護士為成人病患滴耳藥時，應注意的技巧為 (A) 將其外耳向下、向後拉，以使耳道
變直 (B) 將其外耳向上、向後拉，以使耳道變直 (C) 將其外耳向上、向前拉，使耳道
有足夠空間 (D) 將其耳垂向下、向前拉，使耳道有足夠空間。
21. 靜脈注射時，當注射部位發生紅、腫、熱、痛，觸摸靜脈部位硬且有壓痛感，應如何處理？
(A) 拔除後重打，局部抬高和濕熱敷 (B) 拔除後重打，局部冷敷，並抬高注射部位
(C) 拔除後重打，熱敷並按摩之，促進血液循環 (D) 拔除後重打，速度漸慢，並冷敷消腫
22. 李先生，43 歲，體重 68 公斤，因手術後傷口感染接受 Prostaphylline 靜脈注射治療
，其醫囑為「Prostaphylline 2gm IV q6h」，現 Prostaphylline 250mg/vial，請問每次
給藥時，需給多少 vial 的 prostaphylline (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8。
23. 下列何種藥物，不適合靜脈注射？(A) 刺激性 (B) 油狀溶液 (C) 高滲性 (D) 水溶性。
24. 每天的排尿次數及量過度減少，且每日尿總量在 400~500c.c. 以下，此種情況稱為
(A) 少尿 (B) 閉尿 (C) 無尿 (D) 頻尿
25. 病人灌腸時主訴腹痛，此時護士合宜的處理是 (A) 將肛管再插深一點，繼續灌
(B) 將肛管拉出來一些，再繼續灌 (C) 先關閉管夾，暫停一下，等腹痛緩解後再灌
(D) 立刻停止灌腸，並收拾用物。
26. 請選出護士包紮繃帶時，正確的包紮原則 (A) 包紮所使用的力量越緊越好，以防止繃帶脫落
(B) 包紮方向應逆人體循環，由遠心端向近心端包紮 (C) 包紮有傷口的肢體，繃帶可直接
與傷口接觸 (D) 繃帶包紮完畢，應結帶固定於肢體內側部位。
27. 照顧嚴重急性呼吸症候群的病人時，所需的隔離措施為：(A) 絕對隔離 (B) 胃腸道隔離
(C) 血液或體液隔離 (D) 呼吸道隔離。

康寧醫護暨管理專科學校九十二學年度二年制夜間部
在 職 專 班 入 學 考 試
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數 3/4

28. 適合消毒病房地面之化學消毒劑為 (A)1-5% Lysol (B)Alcohol (C)Betadine (D)Cidex。
29. 病房中空氣的消毒，以下列何者最合適？(A) γ -射線 (B)X光 (C)紅外線 (D)紫外線。
30. 護士發現病患有 2x 3 公分的破皮是屬於 1. 主觀資料 2. 客觀資料 3. 症狀(symptom) 4. 癍象(sign) (A)1.2 (B)2.3 (C)2.4 (D)3.4。
31. 下列有關非語言溝通的敘述，何者最為恰當？(A)是最容易被正確了解的(B)能反映個人內心的訊息 (C)不會有文化差異的溝通 (D)因為沒有語言的表達，所以不會影響溝通內容。
32. 下列有關醫囑的敘述，下列何者最正確 (A)St. order 是指自開例醫囑後起，直到醫囑停止為止 (B)S. O. S. order 是指需要時給予 (C) p. r. n. order 是指需時給予(D)S. O. S. 及 p. r. n. 皆是長期醫囑。
33. 在體溫單上，體溫脈搏呼吸欄中，紅空心圓圈所表示的除為發燒處理後的體溫外，還可用於下列何種情況？(A)不規則的脈動 (B)第二次測量的脈搏 (C)心尖脈 (D)用氧患者的呼吸。
34. 護理診斷的三要素為(A)problem、etiology、syndrome (B) problem、etiology、sign and symptom (C) problem、estimate、syndrome (D) practice、etiology、syndrome。
35. 鼓勵手術後病人執行床上腿部運動，是為了預防下列何種合併症 (A)意識混亂 (B)呼吸道分泌物鬱積 (C)傷口感染 (D)深部血栓靜脈炎。
36. 全關節運動中「內翻」與「外翻」動作的適用部位為：(A)肩關節 (B)前臂 (C)髖關節 (D)踝關節。
37. 護理人員在協助病人翻身及移位時，應使用適當的身體力學機轉，以避免肌肉扭傷及疲勞，下列何種動作較為適宜？(A)儘量使用舉起的動作，少作推、拉動作 (B)儘量以屈膝代替腰部彎曲 (C)脊柱保持平直，儘量雙腳併攏，以維持重心線之平直 (D)移動病人時，應儘量遠離病人，以避免直接接觸病人。
38. 發燒以冰枕降溫，主要是利用下列哪項原理達到效果(A)蒸發 (B)對流 (C)傳導 (D)輻射。
39. 蔡太太產後 6 小時未解尿，經誘尿無效，依醫囑給予留置導尿。護理人員在執行導尿技術時，下列敘述何者正確？ 1 整個過程需採無菌技術； 2 插入的導尿管長度約 2 吋； 3 確定位置後打 20CC 液體入氣囊； 4 導尿管應固定於大腿內側下緣，尿道口與固定處間應留足夠之長度； 5 為增加膀胱肌肉彈性，可用管夾夾住導尿管，每 7~8 小時開放一次； 6 蓄尿袋每 24 小時排空一次即可，不宜頻繁打開，並記錄尿量；7 每週更換一次尿袋 (A)1. 3. 5. 6 (B)1. 2. 4. 7 (C)2. 4. 5. 7 (D)1. 4. 5. 7。
40. 訓練壓力性尿失禁個案膀胱的運動是 (A)腹部按摩運動 (B)抬臀運動 (C)仰臥起坐運動 (D)凱格氏 (Kegel's) 運動。
41. 下列有關治療飲食的敘述，何者錯誤？ (A)直腸手術後病患採低渣飲食 (B)消化性潰瘍病患可予溫和飲食(bland diet) (C)溫和飲食(bland diet)為調味料與纖維質含量較少之飲食 (D)肝昏迷病患予高蛋白飲食(high protein diet)。

康寧醫護暨管理專科學校九十二學年度二年制夜間部
在職專班入學考試
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數 4/4

42. 病人灌腸最適宜的姿勢及目的，下列敘述何者正確 (A)採左側臥，因降結腸位於身體左側，可藉重力助溶液流入結腸 (B)採屈膝仰臥式，使腹肌收縮，增加腹壓，利於排便 (C)採右側臥，利用虹吸原理助溶液流入結腸 (D)採膝胸臥式，使肛門括約肌收縮，易於插入肛管。
43. 張小妹妹手術後醫囑是：Kofatol 125mg Q8H IV Drip，此藥物是 500mg/vial 呈粉末狀。若您以蒸餾水溶解預備一次的用量，下列準備法何者正確？(A)以 3ml 蒸餾水溶解後，抽取 0.5ml 使用 (B)以 4ml 蒸餾水溶解後，抽取 1ml 使用 (C)以 5ml 蒸餾水溶解後，抽取 1.5ml 使用 (D)以 6ml 蒸餾水溶解後，抽取 2ml 使用。
44. 當病人採口服給藥方式時，下列注意事項何者為非？(A)服用鐵劑時，應該用吸管吸之 (B)服治咳嗽的糖漿應多喝開水沖可增加藥效 (C)病人吃藥後若有嘔吐現象，應通知醫生評估是否再補足劑量 (D)若口服藥水(如油類藥品)味道令其難以下嚥，先含小冰塊後再服藥。
45. 執行盤尼西林(Penicillin)皮膚試驗，下列何者正確？(A)注射 0.5ml 藥液，劑量約 50~100U (B)注射 0.1ml 藥液，劑量約 100~200U (C)注射 0.5ml 藥液，劑量約 300~500U (D)注射 0.1ml 藥液，劑量約 300~500U。
46. 下列有關輸血的敘述何者正確？1. 輸血前需經雙重核對無誤後，才能投予病人 2. 輸血前先輸入 5% 葡萄糖水溶液 3. 為避免體溫下降，可使用輸血加溫器 4. 輸血速度應低於 40 gtt/min 5. 輸血管路可給予藥物 6. 輸血產生反應時，應立即拔掉 IV set 7. 勿將血袋置於室溫下超過 4 小時 8. 開始輸血的前 15 分鐘，要密切觀察病人反應：(A)1. 2. 3. 4 (B)1. 3. 7. 8 (C)1. 3. 4. 6 (D)1. 3. 5. 8。
47. 林先生，70 kg，其「輸入排出記錄單」記有昨日 24 hrs 的總輸入量，各為 IVF 820 ml，PO 1000 ml；排出量是 Urine 1200 ml，Stool 1 次(中量)，N-G Decompression 10 ml。請評估林先生輸出入量的狀況，是屬於下列何者？(A)輸入量 > 輸出量，會造成水份攝取量過多(Overhydration) (B)輸入量 < 輸出量，排出量過多，易造成脫水(Dehydration) (C)林先生的總輸出量佔輸入量，約 54% (D)輸出量與輸入量近相等。
48. 呼吸的速率和深度由緩而淺，漸而增加速率及深度，直至呼吸困難最高點，旋即逐漸下降，直到呼吸暫停或完全停止。此呼吸型態是哪一類型？(A)端坐呼吸(Orthopneic Position R.) (B)庫斯毛耳氏呼吸(Kussmaul's R.) (C)潮氏呼吸(Cheyne-Stoke R.) (D)畢歐氏呼吸(Biot's R.)。
49. 有關檢體收集的方法，下列何者有誤？(A)留痰液常規檢查時，應收集清晨醒來未進食前的第一口痰 (B)做尿液培養時，須以無菌技術導尿以留取尿液檢體 (C)採血放置於有抗凝劑之試管中，應避免搖晃試管 (D)欲檢驗阿米巴原蟲的糞便，需 30 分中內送檢。
50. 王先生在診斷肺癌末期後，發願作善事並求神保他活著參加兒子的婚禮，此現象屬於哪一期的心理反應？(A)否認期 (B)磋商期 (C)憂鬱期 (D)接受期。

(全部題目到此結束，請將答案填寫於答案卷上！)