

康寧醫護暨管理專科學校九十三學年度  
二年制夜間部在職专班入學考試  
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數：1

單選題（每題二分，答錯不倒扣，滿分一百分，並將正確答案填寫於答案卷上）

1. 下列何項護理活動不能發揮護理之獨立性功能(independent function)? (A)教導病人胰島素自我注射的技巧 (B)病人呼吸困難時，予採半坐臥姿勢 (C)協助醫師進行身體檢查 (D)病人主訴小便困難，以會陰沖洗來誘尿。
2. 依我國醫療保健體系的分類，日間照護等，均歸屬於下列何者？(A)預防保健體系 (B)疾病醫療體系 (C)居家照護體系 (D)持續照護體系。
3. 一般成人最常使用的周邊脈搏測量部位是：(A)肱動脈 (B)頸動脈 (C)橈動脈 (D)足背動脈。
4. 有關隔離病房的敘述何者有誤(A)負壓隔離病房之設置，主要讓室內空氣不會外流 (B)抵抗力弱的個案，如器官移植病人需住負壓隔離病房 (C)SARS 病人需住負壓隔離病房 (D)正壓病房之室內空氣會由內往外流通。
5. 醫院內最常見的意外災害是：(A)燙傷 (B)割傷 (C)跌傷 (D)觸電。
6. 在體溫單上，體溫脈搏呼吸欄中，紅空心圓圈所表示的除了心尖搏外，還可用於下列何種情況？(A)不規則的脈動 (B)高血壓患者的舒張壓 (C)發燒處理後的體溫 (D)用藥過量者的呼吸。
7. 依據「焦點記錄法」，「鼓勵病人早期下床活動」歸之為下列何者？(A)衛教 (B)反應 (C)護理行動 (D)資料。
8. 全關節運動中「內翻」與「外翻」動作的適用部位為：(A)肩關節(B)前臂(C)髓關節(D)踝關節。
9. 點眼藥時，依處方OS 應是給予：( A)受感染的眼 (B)右眼 (C)左眼 (D)雙眼。
10. 執行口腔護理，具安全、有效、經濟、方便功能之漱口水為下列何者？(A)鮮檸檬水 (B)李施德林溶液 (C)多貝爾氏溶液 (D)生理食鹽水。
11. 下列何者違反了外科無菌之原則？(A)佈置無菌區於與腰帶同高之桌面上 (B)使用無菌敷料鉗時，鉗尖朝上 (C)打開有蓋容器取無菌物品時，以蓋口朝上之方式，置蓋子於桌上 (D)非無菌物品遠離無菌品 2 尺以上。
12. 下列何種藥物應用吸管服用，以免造成琺瑯質之損傷？(A)鐵劑(B)油劑類(C)抗生素(D)磺胺類藥
13. 最常用來表達非語言的行為是(A)面部表情(B)聲調(C)手勢(D)姿勢。
14. 病人入院時，護士最先使用的護理技術是：(A)測量身高體重 (B)測量生命徵象(C)觀察病人(D)環境介紹。
15. Gordon 的十一項健康型態功能評估在護理過程中 ~~主要是用在那個階段~~ (A)診斷 (B)評估 (C)計劃 (D)執行。
16. 護理診斷的三要素為(A)problem、etiology、syndrome (B)problem、etiology、sign and symptom (C) problem、estimate、syndrome (D)practice、etiology、syndrome。
17. 下列何者應依一般性不可燃廢棄物處理？(A)導尿用物 (B)傷口敷料 (C)點滴瓶 (D)菜渣及免洗餐具。
18. 為病人執行存留導尿過程中，當把液體打入氣囊時病人感覺疼痛，合宜的處理為：(A)請病人先忍痛，將剩下的液體全部打入氣囊，再往外輕拉看是否脫出 (B)把氣囊之液體抽出，將導尿管向內推約 1/2 尺，再試著打液體入氣囊，注意病人是否仍疼痛 (C)告訴病人這是他比較敏感，同時將打入氣囊之液體量改為打入等量的空氣，再告訴病人打入空氣較不痛 (D)告訴病人這是正常現象，同時將導尿管之固定處與固定部位間留足夠的長度。
19. 在睡眠的快速動眼期(REM)時，那一種荷爾蒙會大量釋放？(A)腦下垂體後葉之 ADH (B)生長激素 (C)腎上腺素 (D)甲狀腺素。
20. Pulse deficit (脈搏短拙)是指：(A)心尖搏動次數少於橈動脈搏動 (B)心尖搏動次數多於橈動脈搏動 (C)心尖搏動等於脈搏次數 (D)脈搏跳動次數低於正常搏動次數。
21. 下列有關人體「體溫」的敘述何者為非？(A)一般而言老年人的體溫較低是與體溫調節功能退化有關 (B)激烈活動會使體溫上升 (C)由於排卵後黃體素的分泌增加會使體溫下降 (D)人處於壓力時腎上腺素分泌增加，新陳代謝增加，體溫上升。
22. 下列有關甘油灌腸的敘述，何者不正確？(A)溶液量以不超過 240c.c. 為原則 (B)甘油與水的比例為 1:1 (C)主要目的是潤滑作用以保護腸黏膜 (D)屬於小量灌腸。

(請翻至第二頁，繼續作答)

康寧醫護暨管理專科學校九十三學年度  
二年制夜間部在職專班入學考試  
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數：2

23. 左心室收縮時，流入主動脈的血液，對於動脈管壁，所產生的最高壓力，稱之為：(A)收縮壓(Systolic Pressure)  
(B)舒張壓(Diastolic Pressure) (C)脈搏壓(Pulse Pressure) (D)平均血壓(Mean Pressure)。
24. 濒死病人不會出現的呼吸型態：(A)陳施氏呼吸(Cheyne-Stokes) (B)潮氏呼吸 (C)喟嘆式呼吸(Sighing) (D)庫斯毛耳氏呼吸(Kuss-mau's)。
25. 醫囑中，給藥時間出現英文縮寫的“q.o.d.”，其中文意思是指：(A)每隔一天 (B)一天四次 (C)如有需要給一次 (D)急救時給。
26. 在劃 TPR 時，若體溫與脈搏重疊時，應如何表示？(A)脈搏劃於體溫之外圈 (B)體溫劃於脈搏之外圈 (C)以二個空心圈並列在同位置 (D)以二個實心圓並列於同一位置
27. 藥瓶上註明「2c.c. 溶液中含 80mg 藥物」，醫囑給予病患 60mg 時，應從瓶中抽出多少 c.c. 溶液？(A)1.5 (B)0.75  
(C)1 (D)1.75。
28. 準備消毒傷口過程中，不慎掉落地上的棉球，應歸屬於下列何種廢棄物？(A)一般性可燃類 (B)一般性不可燃類 (C)感染性可燃類 (D)感染性不可燃類。
29. 倒無菌溶液之注意事項何者有誤？(A)倒完無菌溶液後，應以乾棉球由上往下擦拭，不可來回擦拭。 (B)手掌應握住無標籤處，以利傾倒時確定所倒溶液名稱正確。 (C)應先倒少量溶液以沖洗瓶口灰塵。 (D)應輕輕倒出，避免溶液濺出。
30. 有關無菌技術原則，下列何者有誤？(A)無菌紗布打開尚未用完不可以再放回無菌包內 (B)無菌的區域必須維持在腰部以上 (C)使用無菌器械盒時，移開蓋子時應把蓋子放在桌面上，蓋口應朝下 (D)打開無菌包布時，應注意包布之有效期限。
31. 長期臥床不動，對骨骼肌肉系統的影響，不列何者除外？(A)龍關節內旋 (B)骨質疏鬆 (C)背部酸痛 (D)肌肉萎縮。
32. 你為病人執行下列之措施時，何項是不需要使用外科無菌技術？(A)抽血 (B)導尿 (C)塞陰道栓劑 (D)更換點滴輸液袋。
33. 有關醫囑單出現「Order Renew」時，其具有的意義，下列敘述何者為正確？(A)是因為醫師發現醫囑有錯誤，故重新開立 (B)Order Renew 以前先開立的醫囑仍是照常執行 (C)Order Renew 以下的醫囑才是有效的 (D)是於病人出院時才會出現 Order Renew。
34. 成人測心尖脈的位置為：(A)第二肋間的胸骨左緣 (B)第五肋間的胸骨左緣 (C)胸骨中線與第五肋間交會處 (D)左鎖骨中線與第五肋間交會處。
35. 協助鼻胃管置入後，如何確定胃管置於胃內？1. 反抽有胃液 2. 灌食空針打入 10-20CC 的空氣，用聽診器聽到空氣入胃的聲音 3. 病人無法說話臉色發青 4. 胃管末端置於水中，有氣泡出現 (A)1+2 (B)1+2+3 (C)2+3+4 (D)1+2+3+4。
36. 下列有關成人大量灌腸 (Large amount enema) 時之要項說明，何者為非？(A)選擇肛管，可為 22 Fr. (B)灌腸的壓力為灌腸筒液面至直腸的高度為 6-8 吋 (C)肛管插入深廣度約為 3~4 吋 (D)宜採左側臥，因降結腸位於身體左側，可藉重力助溶液流入結腸。
37. 當病人使用三叉導尿管(3 way foley)時，有關的三個管腔之作用，下列何者為是？1. 固定 2. 排氣 3. 引流尿液  
4. 灌注治療 (A)1+2 (B)1+3+4 (C)2+3+4 (D)1+2+3+4。
38. 護理診斷：「尿瀦留」，其定義性特徵為①嗜睡 ②滴尿 ③呼吸乾囉音 ④夜尿 ⑤溢出性尿失禁 ⑥感覺膀胱鼓脹 ⑦餘尿<50CC (A) ①②⑤⑦ (B) ②③④⑦ (C) ②④⑤⑥ (D) ②⑤⑥⑦。
39. 輸血前，護理人員應先執行雙重核對法，何謂雙重核對法？(A)輸血前核對血液、血型、病人姓名、床號，輸血後再核對血袋一次 (B)準確核對血液、血型、病人姓名、床號確定無誤後，再請另一護士核對 (C)輸血前準確、無誤的核對血液、血型、病人姓名、床號共兩次 (D)與病患核對血液、血型、病人姓名、床號兩次，確定無誤後再輸血。

(請翻至第三頁，繼續作答)

康寧醫護暨管理專科學校九十三學年度試  
二年制夜間部在職專班十八學考  
科別：護理科 考試科目：基本護理學 頁數：3

40. 教導病人強化其會陰肌肉之運動，下列何者最有效？(A)Crade's method (B)Range of motion (C)Lamaze exercise (D)Kegel's exercise。
41. 張惠妹騎腳踏車不小心摔下車來，扭傷了膝蓋，流了很多血，整個膝蓋腫脹。張惠妹到醫院作傷口消毒及敷藥後，回家應作下列何種處理？(A)用熱水袋止痛消腫 (B)用冷敷減輕出血、消腫及炎性反應 (C)先用冷敷，48小時之後再用熱敷 (D)已到醫院敷藥就好，不需再作什麼處理。
42. 溫水拭浴後所測得之體溫，在體溫單上正確之記錄為：(A)在40°C以上的溫度寫酒精拭浴後之體溫 (B)在35~37°C之間寫酒精拭浴後之體溫 (C)在該度數以紅色空心圓點上並以虛線和拭浴前體溫相連 (D)在該度數以藍色實心圓點上並以實線和拭浴前體溫相連。
43. 王先生昨日行甲狀腺切除手術，主訴傷口及咽喉處疼痛，有少許白色黏痰，一咳就傷口更痛，醫囑：Steam Inhalation 15' qid，請問李先生做此治療之目的主要為：①減輕局部刺激腫脹 ②稀釋呼吸道分泌物，使易咳出 ③增加呼吸道黏膜濕潤 ④減少咳嗽導致傷口疼痛。(A) ①③④ (B) ①②④ (C) ②③④ (D) ①②③。
44. 謝老太太主訴近一天來有頻尿、解尿時有燒灼感，尿液培養結果為大腸桿菌(E. Coli)感染，下列護理指導，何者適宜？(A)請醫師開立存留導尿醫囑，並在執行後同時會陰沖洗 (B)教導每次解完大、小便後，應由前往後擦拭並作會陰沖洗 (C)教導謝老太太平日也應常更換衛生巾，並常作會陰灌洗 (D)教導謝老太太多攝取柑橘類果汁，以防pH值改變。
45. 約束病人肢體時，應至少15分鐘觀察一次被約束肢體的有無變黑，並評估病人肢體的：1.氣味 2.肌肉 3.顏色 4.溫度 5.活動 6.感覺 7.形狀。(A)1 2 3 4 (B)3 4 6 7 (C)3 4 5 6 (D)3 4 6 7。
46. 依徒手肌肉檢查(Muscle test)結果為不佳(Poor)者，協助個案做ROM之運動種類宜為：(A)被動 (B)協助主動 (C)主動 (D)加阻力。
47. 有關「等張運動」之敘述下列何者為正確？(A)無關節的活動，亦無肌肉長度改變之運動 (B)肌肉收縮時，肌肉長度改變，而張力不變 (C)肌肉收縮時，肌肉長度不變，張力改變 (D)為一種靜態的運動，又稱肌肉固定運動。
48. 下列有關低溫消毒的敘述，何者最為正確：①又稱為巴氏消毒法 ②常用於不耐高溫的飲品消毒 ③加熱30度C、維持60分鐘 ④也可以用於外科器械消毒 (A)①②③④ (B)①③④ (C)①②③ (D)①②。
49. 王太太為肝癌末期患者，護理人員踏入病室時，王太太往門邊丟了一個杯子過來，口中大罵：「怎麼是我，我到底做錯了什麼？」。請問王太太的行為表現是？(A)Shock (B)Bargaining (C)Depression (D)Anger。
50. 下列與包紮有關的護理，正確者為：①包紮之前觀察肢體顏色，作為包紮後觀察血循的比較 ②包紮的方向由近端向遠端 ③包紮處若有傷口應先以無菌敷料覆蓋 ④關節處不適合打結 ⑤所有包紮的肢體，皆應露出末端以便觀察。(A) ①②③④ (B) ①②④⑤ (C) ②③④⑤ (D) ①②④⑤。

(題目到此結束，請將正確答案填寫於答案卷上)